

## ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  
Αναθεώρηση: Απρίλιος 2007)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΦΑΡΜΑΚΟ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΛΗ ΔΟΣΗ 30' - 60' ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ	
		ΕΝΗΛΙΚΕΣ	ΠΑΙΔΙΑ
Συνηθισμένη προφυλακτική χειμειοπροφύλαξη	Αμοξικιλίνη (Amoxil)	2 gr	50 mg/κιλό βάρους σώματος
Αδυναμία λήψης φαρμάκων από το στόμα	Αμπικιλίνη (Pentrexyl) ή Κεφαζολίνη ή Κεφτριαξόνη (Biozolin ή Farcef)	2 gr EM ή ΕΦ*	50 mg/κιλό βάρους EM ή ΕΦ
	Κεφαλεξίνη**† ή Κλινταμυκίνη (Dalacin) ή Αζιθρομυκίνη (Zithromax) ή Κλαριθρομυκίνη (Klaricid)	2 gr  600 mg  500 mg	50 mg/κιλό βάρους  20 mg/κιλό βάρους  15 mg/κιλό βάρους
Αλλεργία στην πενικιλίνη και αδυναμία λήψης φαρμάκων από το στόμα	Κεφαζολίνη ή Κεφτριαξόνη (Biozolin ή Farcef) † ή Κλινταμυκίνη (Dalacin)	1 gr EM ή ΕΦ  600 mg EM ή ΕΦ	50 mg/κιλό βάρους EM ή ΕΦ  20 mg/κιλό βάρους EM ή ΕΦ

\* EM = ενδομυϊκά, ΕΦ = ενδοφλέβια

\*\* ή άλλη κεφαλοσπορίνη πρώτης ή δεύτερης γενιάς σε κατάλληλη δόση

† Οι κεφαλοσπορίνες δεν πρέπει να χορηγούνται σε άτομα με ιστορικό αναφυλακτικής αντίδρασης, αγγειοοιδήματος ή ουρτικαρίας σε πενικιλίνες

Μην παίρνετε τα φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή ή χωρίς να επικοινωνήσετε πρώτα με τον παθολόγο σας ή το Περιοδοντολογικό Ιατρείο

Αν είναι απολύτως αναγκαίο να πάρετε τα φάρμακα αυτά χωρίς συνταγή βεβαιωθείτε, πριν τα πάρετε, ότι δεν έχετε αλλεργία στην πενικιλίνη. Επικοινωνήστε απαραίτητα με τον παθολόγο σας ή το Περιοδοντολογικό Ιατρείο αν δεν είστε απόλυτα σίγουροι ότι είναι ασφαλές να πάρετε τα φάρμακα αυτά. Υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος θανατηφόρου αλλεργικού σοκ.